UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
— EST. 1849 —

ATURAN PENARIKAN KESIMPULAN UNTUK LOGIKA PROPOSISI (Bagian 1)

LOGIKA DAN HIMPUNAN

*DEPARTEMEN MATEMATIKA
FMIPA UI*

PENDAHULUAN

- Apakah penarikan kesimpulan

Mengambil
kesimpulan dari
bukti-bukti

- Aturan penarikan kesimpulan : standar atau model untuk penarikan kesimpulan
- Ada beberapa aturan penarikan kesimpulan.

ATURAN PENARIKAN KESIMPULAN

- Beberapa tautologi adalah aturan penarikan kesimpulan.
- Bentuk umum dari aturan penarikan kesimpulan adalah:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q$$

dimana p_i adalah premis dan q adalah kesimpulan.

1. MODUS PONENS

- Tautologi bentuk $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ adalah dasar aturan penarikan kesimpulan yang disebut *modus ponens*

Bentuk argumen absah:

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Jika pernyataan bersyarat $(p \rightarrow q)$ dan hipotesa dari pernyataan bersyarat (p) benar, maka kesimpulannya harus benar.

CONTOH 1

Misalkan kalimat bersyarat “Jika hari ini hujan, maka saya memerlukan payung” dan hipotesa “Hari ini hujan” adalah benar. Apakah kesimpulannya?

- p : Hari ini hujan.
- q : Saya memerlukan payung.

Maka argumen dari contoh adalah:

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

kesimpulan argumen adalah $\therefore q$ atau “Jadi, saya memerlukan payung.”

CONTOH 2

Perhatikan argumen berikut,

“Jika $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$, maka $(\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2$.”

Diketahui $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$.

Akibatnya $(\sqrt{2})^2 = 2 > (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$.

1. Apakah argumen ini absah?
2. Apakah kesimpulan harus benar karena keabsahan argumen?

CONTOH 2

Misalkan $p : \sqrt{2} > \frac{3}{2}$ dan $q : 2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2$.

Bentuk argumen: Premis : $p \rightarrow q$ dan p . Kesimpulan : q .

1. Argumen absah karena disusun berdasarkan modus ponens.
2. Salah satu premis adalah salah, yaitu $p : \sqrt{2} > \frac{3}{2}$.

Akibatnya, tak dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya benar.

Lebih lanjut, kesimpulan argumen salah $q : 2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2$.

2. MODUS TOLLENS

- Aturan penarikan kesimpulan

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

disebut modus tollens.

Aturan penarikan kesimpulan ini berdasarkan kontrapositif. Dasar dari modus tollens adalah tautologi

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p.$$

CONTOH 3

- Jika saya mengerjakan semua soal latihan di buku, maka saya akan lulus mata kuliah Logika dan Himpunan.
- Saya tidak lulus kuliah Logika dan Himpunan.

p : Saya mengerjakan semua soal latihan di buku.

q : Saya lulus mata kuliah Logika dan Himpunan.

$$p \rightarrow q$$

$$\neg q$$

$$\therefore \neg p$$

- Jadi, saya tidak mengerjakan semua latihan di buku.

3. SILOGISME HIPOTESIS

- Aturan penarikan kesimpulan

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

adalah aturan silogisme hipotesis.

Dasar dari silogisme hipotesis adalah tautologi

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r).$$

CONTOH 4

- Jika saya tidur larut malam, maka saya akan terlambat bangun pagi.
- Jika saya terlambat bangun pagi, maka saya akan terlambat tiba di kelas.
- Jika saya tidur larut malam, maka saya akan terlambat tiba di kelas.

p : Saya tidur larut malam.

q : Saya terlambat bangun pagi.

r : Saya terlambat tiba di kelas

- Aturan penarikan kesimpulan yang digunakan adalah silogisme hipotesis

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore p \rightarrow r$$

- Tautologi: $((p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

SELESAI